SELAS VETODIAG – Laboratoire d'analyses vétérinaires

6 Route du Robillard, 14170 Berville
02 31 41 00 00
contact@vetodiag.fr | www.vetodiag.fr
N° ordinal : 505067
N° Siret : 829 954 544 00013 - N°TVA : FR 35 829 954 544

Dr Nicolas POULETTY DMV, DES, Dipl. ACVP Numéro d'Ordre : 24762
Dr Christelle VOLMER DMV, IPSAV, DESV, Dipl. ECVP Numéro d'Ordre : 19770
Dr Marie-Capucine TRICAUD DMV, MCMVS, PhD Numéro d'Ordre : 20480
Dr Charline ALLEAUME DMV, DESV, Dipl. ECVP Numéro d'Ordre : 23429
Dr Eve LALOY DMV, MSc, PhD, DESV, Dipl. ECVP Numéro d'Ordre : 22469
Dr Charlotte BOYER DMV, DESV, Dipl. ECVP Numéro d'Ordre : 25827

Mme Drouot Hélène

Réceptionné le 22/10/2025

N° de dossier 202510220564
Age --
Animal **Yggdrasil (Chat)**

Clinique Vétérinaire Toute Bête

3 Rue de la Millée
85400 Lucon

Compte rendu édité le 22/10/2025 à 16:12

VERSION VETERINAIRE

Les commentaires et illustrations éventuels ne figurent pas sur la version propriétaire (éditée conjointement)
En savoir plus sur l'interprétation de vos analyses : https://vetodiag.fr/lexique

BIOLOGIE MOLECULAIRE - PCR

Extraction sur QIAcube HT, QIAcube ou Indimag 48S & PCR quantitative en temps réel sur QuantStudio 5
En savoir plus sur les conditions de prélèvement et les règles générales d'interprétation : https://vetodiag.fr/lexique/#pcr

Coronavirus félin (membrane-nucleocapsid gene junction)

Nature ..... Selles
Résultat ..... **Négatif (inférieur au seuil de détection)**

Si un épanchement est présent, une PCR sur le liquide peut être réalisée (sensibilité de 80% et spécificité de 90-100%). En pratique, une charge virale forte dans l'épanchement, associée à l'ensemble des éléments cliniques et biologiques, permet de conclure à une PIF.
Avec une présentation neurologique ou oculaire, une PCR peut aussi être réalisée sur le LCR ou l'humeur aqueuse (sensibilité moyenne et spécificité > 95%). La PCR dans le sang, la rate, les noeuds lymphatiques et la moelle osseuse peut être positive chez des chats sains (charges souvent faibles dans ce cas).
Le diagnostic de certitude reste histopathologique (immunohistochimie).
En savoir plus sur le diagnostic de la PIF et notamment sur son dépistage en élevage : https://vetodiag.fr/lexique/#corona_pcr